

Vaccinations obligatoires pour les nourrissons

Âge approprié	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	11 mois	12 mois	16-18 mois	6 ans	11-13 ans	14 ans	15-19 ans	20-24 ans	25 ans	65 ans	75 ans	80 ans	85 ans	95 ans et +	
BCG																					
DTP et Coqueluche															Tous les 20 ans	1 dose	1 dose			1 dose	1 dose
Hib																					
Hépatite B																					
Pneumocoque																1 dose					
ROR																					
Méningocoques ACWY									Rattrapage recommandé 1 dose avant 5 ans		1 dose		Rattrapage 1 dose								
Méningocoque B													Rattrapage 2 doses à 2 mois								
Rotavirus																					
HPV											2 doses	3 doses	3 doses NR*								
Grippe																1 dose par an					
Covid-19																1 dose par an	2 doses par an				
Zona																2 doses (à 2 mois d'intervalle)					
VRS																1 dose*	1 dose				

Tuberculose (BCG)

Vaccination le plus souvent recommandée à partir de 1 mois et jusqu'à l'âge de 15 ans chez les enfants exposés à un risque élevé.

Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite (DTP)

Les rappels de l'adulte sont recommandés à âges fixes soit 25, 45, 65 ans et ensuite tous les dix ans.

Coqueluche

Rappel de l'adulte : à 25 ans avec rattrapage possible jusqu'à 39 ans.
Femme enceinte : recommandé dès le 2ème trimestre pour protéger le nourrisson.

Haemophilus Influenzae de type b (Hib)

Pour les enfants n'ayant pas été vaccinés avant 6 mois, un rattrapage vaccinal peut être effectué jusqu'à l'âge de 5 ans avec le vaccin monovalent (1 à 3 doses selon l'âge).

Hépatite B

Si la vaccination n'a pas été effectuée au cours de la 1ère année de vie, elle peut être réalisée jusqu'à 15 ans inclus. À partir de 16 ans, elle est recommandée uniquement chez les personnes exposées au risque d'hépatite B.

Pneumocoque

Obligatoire chez tous les nourrissons
Recommandée aux personnes de 65 ans et +

Rougeole-Oreillons-Rubéole (ROR)

Pour les personnes nées à partir de 1980, être à jour signifie avoir eu deux doses de vaccin.

Méningocoques ACWY

Obligatoire chez tous les nourrissons depuis le 1er janvier 2025 avec une dose à 6 mois suivie d'un rappel à 12 mois.
Recommandée chez les 11-14 ans.

Rattrapage : 1 dose jusqu'à 4 ans révolus

Méningocoque B

Depuis janvier 2025, vaccination obligatoire chez tous les nourrissons à 3, 5 et 12 mois.

Rattrapage : jusqu'à 5 ans

Rotavirus

Recommandé à tous les nourrissons à partir de 2 mois. 2 à 3 doses (par voie orale) sont nécessaires selon le vaccin.

Papillomavirus humain (HPV)

Vaccination recommandée chez les filles et les garçons de 11 à 14 ans
Rattrapage : jusqu'à 24 ans (*non remboursé entre 20 et 24 ans). Vaccination recommandée aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) jusqu'à 26 ans.

Grippe

Vaccination recommandée chaque année notamment pour les personnes à risque de complications : les personnes âgées

de 65 ans et +, celles atteintes de certaines maladies chroniques dont les enfants à partir de 6 mois, les femmes enceintes et les personnes souffrant d'obésité (IMC > 40 kg m²).
Peut aussi être proposée à tous les enfants de 2 à 17 ans.

Covid-19

En automne, en plus des personnes à risque ciblée par la grippe, cette vaccination est recommandée aux personnes atteintes de troubles psychiatriques, de démence ou de trisomie 21.
Au printemps, vaccination recommandée pour les 80 ans et +, les résidents d'EHPAD et USLD, et les personnes immunodéprimées quel que soit leur âge.

Zona Recommandée chez les 65 ans et +

VRS

Recommandées aux 75 ans et +
*Egalement recommandée aux personnes âgées de 65 ans et + ayant des pathologies respiratoires chroniques (particulièrement broncho pneumopathie chronique obstructive) ou cardiaques (particulièrement insuffisance cardiaque).

GROSSESSE

Quand proposer la vaccination ?



**Grippe saisonnière du 15 octobre au 28 février
+ Covid dès le 1er trimestre**

A proposer conjointement, en 2 sites d'injection distincts
Covid : Vaccins ARN uniquement (Pfizer et Moderna)

Qui peut prescrire et vacciner ?

- Médecins
- Sages-femmes
- Infirmiers
- Pharmaciens

Coqueluche

Quelle que soit la date du
dernier rappel
Repevax ou Boostrix Tetra

Prévoir un
intervalle de
2 semaines

**Bronchio-
lite**