

	Vaccinations obligatoires pour les nourrissons																				
Âge approprié	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	11 mois	12 mois	16-18 mois	6 ans	11-13 ans	14ans	18 ans	25 ans	26 ans	65 ans	75 ans	80 ans	85 ans	95 ans et +	
BCG																					
DTP et Coqueluche														Tous les 20 ans		1 dose	1 dose		1 dose	1 dose	
Hib																					
Hépatite B																					
Pneumocoque													1 dose*		1 dose						
ROR																					
Méningocoques ACWY									Rattrapage 1 dose avant 5 ans		1 dose		Rattrapage 1 dose								
Méningocoque B													Rattrapage 2 doses à 2 mois								
Rotavirus																					
HPV											2 doses		Rattrapage 3 doses								
Grippe						1 dose par an*										1 dose par an					
Covid-19						1 dose par an*										1 dose par an		2 doses par an			
Zona													2 doses à 2 mois*		2 doses (à 2 mois d'intervalle)						
VRS	1 dose de septembre à janvier								1 dose							1 dose*	1 dose				

Tuberculose (BCG)

Vaccination le plus souvent recommandée à partir de 1 mois et jusqu’à l’âge de 15 ans chez les enfants exposés à un risque élevé.

Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite (DTP)

Les rappels de l’adulte sont recommandés à âges fixes soit 25, 45, 65 ans et ensuite tous les dix ans.

Coqueluche

Rappel de l’adulte : à 25 ans avec rattrapage possible jusqu’à 39 ans.
Femme enceinte : recommandé dès le 2ème trimestre pour protéger le nourrisson.

Haemophilus Influenzae de type b (Hib)

Pour les enfants n’ayant pas été vaccinés avant 6 mois, un rattrapage vaccinal peut être effectué jusqu’à l’âge de 5 ans avec le vaccin monovalent (1 à 3 doses selon l’âge).

Hépatite B

Si la vaccination n’a pas été effectuée au cours de la 1ère année de vie, elle peut être réalisée jusqu’à 15 ans inclus. À partir de 16 ans, elle est recommandée uniquement chez les personnes exposées au risque d’hépatite B.

Pneumocoque

Obligatoire chez tous les nourrissons
Recommandée aux personnes de 65 ans
*et à partir de 18 ans aux personnes à risques

Rougeole-Oreillons-Rubéole (ROR)

Pour les personnes nées à partir de 1980, être à jour signifie avoir eu deux doses de vaccin.

Méningocoques ACWY

Obligatoire chez tous les nourrissons depuis le 1er janvier 2025 avec une dose à 6 mois suivie d’un rappel à 12 mois.
Recommandée chez les 11-14 ans.
Rattrapage : 1 dose jusqu’à 4 ans révolus

Méningocoque B

Depuis janvier 2025, vaccination obligatoire chez tous les nourrissons à 3, 5 et 12 mois.
Rattrapage : jusqu’à 5 ans

Rotavirus

Recommandé à tous les nourrissons à partir de 2 mois. 2 à 3 doses (par voie orale) sont nécessaires selon le vaccin.

Papillomavirus humain (HPV)

Vaccination recommandée chez les filles et les garçons de 11 à 14 ans
Rattrapage : jusqu’à 26 ans révolus.

Grippe

*Vaccination recommandée chaque année notamment pour les personnes à risque de complications : les personnes âgées de 65 ans et +, celles atteintes de certaines maladies chroniques dont les enfants à

partir de 6 mois, les femmes enceintes et les personnes souffrant d’obésité (IMC > 40 kg m²).
Peut aussi être proposée à tous les enfants de 2 à 17 ans.

Covid-19

En automne, en plus des personnes à risque ciblée par la grippe, cette vaccination est recommandée aux personnes atteintes de troubles psychiatriques, de démence ou de trisomie 21.
Au printemps, vaccination recommandée pour les 80 ans et +, les résidents d’EHPAD et USLD, et les personnes immunodéprimées quel que soit leur âge.

Zona

Recommandée chez les 65 ans et +

VRS Nourrissons nés après le 1er janvier de l’année en cours : campagne de septembre à fin janvier et rappel la deuxième année pour les nourrissons à risques. Recommandées aux 75 ans et +
*Egalement recommandée aux personnes âgées de 65 ans et + ayant des pathologies respiratoires chroniques (particulièrement broncho pneumopathie chronique obstructive) ou cardiaques (particulièrement insuffisance cardiaque).

GROSSESSE

Quand proposer la vaccination ?



**Grippe saisonnière du 15 octobre au 28 février
+ Covid dès le 1er trimestre**

A proposer conjointement, en 2 sites d'injection distincts
Covid : Vaccins ARN uniquement (Pfizer et Moderna)

Qui peut prescrire et vacciner ?

- Médecins
- Sages-femmes
- Infirmiers
- Pharmaciens

Coqueluche

Quelle que soit la date du
dernier rappel
Repevax ou Boostrix Tetra

Prévoir un
intervalle de
2 semaines

**Bronchio-
lite**